

Cattle, pigs and dogs

Biseptyl[®]

動物藥入字第06617號



必勝妥[®]

- ◎以1:2比例結合Lincomycin和Spectinomycin，在藥理上具有非常好之協同作用。
- ◎肌肉注射後2~4小時達到血漿最高濃度。
- ◎維持治療濃度約6~8小時。
- ◎在標的器官中廣泛的分佈，並可通過胎盤障壁。



必勝妥[®]



劑型

注射液

成分

每ml含：

Spectinomycin (as Sulphate)100mg (力價)

Lincomycin (Hydrochloride)50mg (力價)

賦形劑.....加至.....1ml

藥理特性

能有效對抗→

- ◎Staphylococcus aureus (葡萄球菌屬)
- ◎Streptococcus spp (鏈球菌屬)
(β -haemolytical strains) (β -溶血菌株)
- ◎Str. Viridans (草綠色鏈球菌)
- ◎Clostridium tetani (破傷風梭菌)
- ◎Cl. perfringens (產氣莢膜梭菌)
- ◎Erysipelothrix rhusiopathiae (豬丹毒桿菌)
- ◎Leptospira SPP (鉤端螺旋體屬)
- ◎Mycoplasma (黴漿菌)

適應症

豬：赤痢，大腸菌病，地方性肺炎，沙門氏桿菌病和傳染性關節炎。
牛：肺炎，大腸菌病。
狗：肺炎、大腸菌病

用法用量

肌肉注射，每5~10公斤體重注射本品1ml，每12小時注射1次，連續使用4~7天。

禁忌症

勿使用於馬、懷孕或哺乳之雌獸及用於供乳之母牛。

停藥期

豬和牛：肉用14天。
牛：乳品勿供飲用。

包裝

100ml × 60瓶/箱

貯存

本品貯存在乾燥陰涼處(低於25°C)，避免光線照射及避免小孩可及處。

製造廠

Laboratorios Syva, S.A.
西班牙喜驊大藥廠

Biseptyl[®]



台灣總代理



佳力德實業有限公司
Jaritec Industrial Co., Ltd.

http://www.jaritec.com.tw 地址：台北市信義路四段341號6樓之2

電話：02-2700-3163 (代表號)

傳真：02-2325-7047

訂貨專線：0800-212-457

