



用法用量		每1,000隻雞每日的投與推薦量	
肉雞		蛋雞	
密集投與計畫	連續投與計畫	連續投與計畫	
0~14天 ..... 50ml	0~14天 ..... 10ml	幼 雛 ..... 5ml	
15~28天 ..... 100ml	15~28天 ..... 30ml	中 雛 ..... 10ml	
	29~42天 ..... 50ml	成 雛 ..... 20ml	
	43天後 ..... 70ml	產蛋雞 ..... 50ml	

#### 特殊情況投與劑量

- 疫苗投與前3天及後7天，可加2~3倍之連續投與計畫之用量(不可與口服活毒疫苗共同使用)。
- 熱緊迫時可加2~3之連續投與計畫之用量。
- 下痢時可加4倍之連續投與計畫之用量，連續5~7天。
- 轉換料時可加2~3倍之連續投與計畫之用量5~7天。

製造商

**ELT Science Corp.**

台灣總代理

**JRT 佳力德實業有限公司**  
Jaritec Industrial Co., Ltd.

地址：台北市大安區信義路四段341號6樓之2  
電話：02-2700-3163 傳真：02-2325-7047

#### 注意事項

普茂精可與抗生素並用，但與口服活毒疫苗之使用需間隔36小時以上。

#### 包裝

粉劑5kg/包(一箱4包)  
液劑5L/桶(一箱4桶)

PROMOZEN



# 普茂精

GIT 健康促進劑

## PROMOZEN

針對一家禽

普茂精是韓國傳統用在藥材上的植物所提煉出來，這些植物生長在韓國半島中、南部，其有效性來自於全株之植物。

植物性萃取物50%

(Diospyrus lotus 柿屬 + Artemisia capillaries 蒿屬) Vit C

天然有機酸

賦形劑



**TRI-ON**  
TRI-ON International Corp.

# 普茂精

GIT 健康促進劑


## PROMOZEN

針對一家禽

普茂精是韓國傳統用在藥材上的植物所提煉出來，這些植物生長在韓國半島中、南部，其有效性來自於全株之植物。

# PROMOZEN

傳統的草本萃取物在普茂精之中



功效



草藥的藥理性

- 1 促進胃液及腸液的分泌
- 2 刺激消化作用
- 3 促進腸絨毛細胞生長
- 4 抗細菌及抗病毒作用
- 5 超氧化酶的激化
- 6 促進食慾

- 1 促進膽汁製造與分泌
- 2 改善肝腎功能
- 3 抗細菌及抗病毒作用
- 4 抗發炎作用
- 5 刺激產生免疫反應

### 中和內毒素之作用



- 減少氨氣、硫化氫、胺及其他內毒素產生。
- 降低血液中氨及尿素氮(BUN)的指數。
- 抑制慢性肝及腎衰竭的過程。

表：血液中尿素氮指數

	尿素氮指數(BUN level)
對照組	1.04
普茂精	0.51
差異度	0.53

## 普茂精 特性

- 飼料及飲水中非常穩定
- 成分不易受到破壞，可與維生素及抗生素併用。
- 完全天然及生物活性
- 專利生物技術生產。
- 100%天然及環境安全性。
- 特別針對雞隻設計
- 雞具有較短的消化道，對緊迫非常敏感，因此緊迫因子的處理更形重要。
- 經濟有效
- 與益生菌，酸化劑及酵素比較，具有成本優勢。





週邊血液中免疫細胞的組成%

免疫細胞	CD <sub>4</sub>	CD <sub>8</sub>	B-Cell
對照組	24%	19%	18%
普茂精	31%	22%	20%
差異度	+7%	+3%	+2%

### 免疫保護機制



- 增加淋巴細胞之活性以進行細胞吞噬作用及產生抗體。
- 防止會對細胞產生損害的自由基。
- 增加免疫力以抑制病毒性及細菌性病病原菌的感染。



### 針對肉雞的建議用量

添加1ml/普茂精於每公升飲水之中

雞 齡	活體重量	耗水量	添加普茂精劑量
1週齡	150g	30L	30ml
2週齡	370g	60L	60ml
3週齡	700g	90L	90ml
4週齡	1,000g	120L	120ml
5週齡	1,500g	160L	160ml
6週齡	2,000g	190L	190ml



### 針對產蛋雞的建議用量

添加1ml/普茂精於每公升飲水之中

雞 齡	活體重量	耗水量	添加普茂精劑量
1-6週齡	70-480g	25-75L	50ml
7-12週齡	590-1,040g	80-130L	100ml
13-16週齡	1,130-1,370g	140-150L	150ml
成體產蛋雞	1,500-2,300g	160-230L	200ml

接種疫苗的3天前起，至接種後7天，連續使用標準劑量的3倍。  
“不要跟活毒疫苗同時使用”