

蟎寧

Red Dox

紅蟎不產生抗藥性

產品資訊

成分 | 每1公升含：

- 百里香(Thymus vulgaris).....1毫升
- 菊蒿(Tanacetum vulgare).....1毫升
- 牛至(Origanum vulgare).....0.5毫升
- 賦形劑(酒精、水)加至.....1公升

一般用法用量

口服，稀釋於飲水中。

稀釋倍數：每噸飲水添加蟎寧750毫升(根據每隻母雞每日攝取200毫升水量)

使用週期

蛋雞、種雞：於三週齡時，每噸飲水添加蟎寧750毫升，持續 5~7天。

後續：每噸飲水添加蟎寧 1公升，每個月使用一次直到生產週期結束。

特別處理情況

第一個月	連續使用8~10天	停止使用15天	連續使用8~10天
第二~三個月	停止使用15天		連續使用2~3天
第四~六個月	停止使用21天		連續使用2~3天
第七個月起	每個月1次，連續使用1~3天		

注意事項

開始使用後會有紅蟎數量增加的情況，這是紅蟎受到此產品影響，活力下降無法躲回暗處所導致，這證明產品開始生效請安心繼續使用。

※ 請於抗生素治療後再使用效果較佳。



對象動物

家禽，尤其是蛋雞、種雞等。

天然 尚好



• 包裝 | 5公升×4罐／原裝箱。

• 有效日期 | 製造日起24個月。

供應商



DOX-AL ITALIA S.p.A. Via Mascagni, 6/A, 20884 Sulbiate (MB), Italy



義大利原裝進口

代理商



佳力德實業有限公司 Jaritec Industrial Co.,Ltd.

地址 | 台北市大安區信義路四段341號6樓之2 電話 | 02-2700-3163 傳真 | 02-2325-7047

<http://www.jaritec.com.tw>

具有抗紅蟎天然成分的
口服液劑

蟎寧

Red-Dox

紅蟎不產生抗藥性

Red-Dox

蟎寧

Red-Dox

紅蟎不產生抗藥性




甚麼是蟎寧?

紅蟎對於家禽養殖來說是個威脅動物福祉的問題，每年都會對家禽，尤其是飼養期較長的蛋雞、種雞造成經濟損失。**蟎寧**的設計是含有紅蟎無法代謝的天然毒素成分，使家禽能發展免疫系統來對抗紅蟎。紅蟎感覺到有此毒素就不會再靠近家禽，或者紅蟎吸了血後，毒素會導致血液凝固在紅蟎體內。

甚麼是蟎寧

生命週期根據環境狀態(溫度、濕度)為期7至12天，紅蟎最理想的生長狀態是25至30℃；成蟲和若蟎皆會吸血，吸血後呈紅色。

紅蟎生活史



紅蟎的影響

- 動物緊迫，生產率、產蛋率下降。
- 動物產生更高的疾病風險。
- 工作人員皮膚刺激、過敏。
- 為控制紅蟎量造成現場工作量增加。
- 經濟損失。



▲ 使用蟎寧前，紅蟎吸血後呈紅色。




▲ 使用蟎寧後，紅蟎由於無法消化血液，顏色呈現暗色。

蟎寧 Red-Dox 對雞舍的效果



第一期



第二期



第三期