



NEOVAC

“喜驊” 豬丹毒不活化菌苗

| 成分 | 每劑 (2ml) 含 |

Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1, E1-6P strain... $\geq 1RP$ (第一血清型)

Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 2, S-192 strain... $\geq 1RP$ (第二血清型)

*RP (Relative Potency, 相對效價)：與參考菌苗效力比較之結果。

| 效能 |

豬 / 預防豬丹毒感染，並降低由此病引起之死亡率、臨床症狀及疾病所造成之損害；投予第二劑二週後可開始產生免疫力，並可持續保護達6個月。

| 用法用量 |

- 使用前先搖勻，在頸部之深部肌肉注射。
- 每隻豬 (任何大小)，給予2ml，一般建議之預防接種計畫如下：

動物	最初的預防接種	補強注射
肉豬	於12週齡時施打1劑	3~4週之後再施打1劑
補強免疫		每6個月追加施打1劑，當有高的感染壓力每3個月追加一劑。
母豬		產仔之後兩週追加施打一劑；為了確保小豬得到保護，母豬分娩之前一個月進行補強注射1劑。

| 禁忌症 | 勿接種於受緊迫或生病豬隻。

| 副作用 | 健康不佳的動物易出現過敏反應但很罕見，出現這些病症建議服用抗組織胺和CORTICOSTEROID (皮質類固醇)。如注意到任何嚴重的反應或包裝裡的仿單沒有提及及其他效應，請諮詢獸醫師。

| 使用之建議 | 1. 只可對健康的動物接種疫苗，必須遵循無菌方法接種。
2. 使用前請用力搖勻本品。

| 懷孕和哺乳期之使用 | 懷孕期和哺乳期都可使用。

| 停藥期 | 無

| 使用類別 | 本處方藥品限由執業獸醫師 (佐) 監督之下使用。

| 注意事項 | 1. 保存於2°C~8°C之間的冰箱冷藏，請勿冷凍。保存於原來的容器。
2. 保存於小孩不可及處。

| 有效期 | 瓶口未打開為2年，保存於+2°C~+8°C

| 包裝 | 50 doses / 100 ml / Bottle



製造廠



Laboratoires syva.S.A.U. Spain
西班牙喜驊大藥廠

進口商

JRI 佳力德實業有限公司 Jaritec Industrial Co.,Ltd.

http://www.jaritec.com.tw 地址 | 台北市大安區信義路四段341號6樓之2 電話 | 02-2700-3163 傳真 | 02-2325-7047

動物藥入字第 07195 號

“喜驊” NEOVAC 豬丹毒不活化菌苗

對抗豬丹毒的**雙重**保護

- Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae **serotype 1** (第一血清型)
- Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae **serotype 2** (第二血清型)



豬丹毒 (SWINE ERYSIPELAS)

兩種丹毒菌株對應的臨床症狀

(第一血清型) Serotype 1 急性豬丹毒 疾病症狀

高燒、突然死亡

顫抖、不協調

典型的“皮膚鑽石斑”

流產



(第二血清型) Serotype 2 慢性豬丹毒 疾病症狀

關節炎、跛腳

心內膜炎

流產

暫時性不孕



什麼時候應該懷疑
豬丹毒是造成
流產的原因？




- 當使用血清學檢查，排除其他可能造成流產的病原菌，像是藍耳病 (PRRS)、鉤端螺旋體 (Leptospira)、披衣菌 (Chlamydia)。
- 當發現流產和季節的關聯：豬丹毒引起的流產好發於氣溫明顯變化的季節，通常是春秋兩季。
- 可以輕易的從流產的胎畜和胎盤中分離出菌株，就能確認是豬丹毒引起的流產。

如何有效預防豬丹毒

菌苗是預防豬丹毒的有效工具

肉豬的接種計畫

豬丹毒產生的初乳抗體在豬體內能夠維持到出生後的12週齡。因此菌苗在那期間之後施打。



種豬的接種計畫

每6個月為所有種豬全面施打豬丹毒菌苗，特別是在風險較高的季節之前，例如春天和秋天之前。



豬丹毒帶原期間

豬丹毒可能會潛伏在扁桃腺 (tonsils) 和迴盲瓣 (ileo-cecal valve) 而不會發病，但是飼養管理、氣候變化、及其他疾病等原因可能會使豬丹毒病原菌再度活躍，使豬隻發病，並且傳染豬丹毒給健康的豬隻。

不當的為肉豬施打豬丹毒菌苗可能也會造成帶原狀態，在正確的時間 (12週齡) 施打豬丹毒菌苗才是正確的預防方式。

