



Florfenis 富洛欣



成分 | Each ml contains

Florfenicol 300mg

Excipients 溫和性賦形劑配方加至 1ml

藥效穩定確實

重視動物福利

溫和性配方

符合最嚴格的

歐盟法規規範

<http://www.jaritec.com.tw>



Florfenis 富洛欣

適用動物 | 治療對富洛欣敏感的細菌

豬 | 治療由豬胸膜肺炎放線桿菌(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)、出血性巴氏桿菌(*Pasteurella multocida*)引起豬的急性呼吸道疾病。

牛 | 治療由溶血性曼哈米亞桿菌(*Mannheimia haemolytica*)、出血性巴氏桿菌(*Pasteurella multocida*)、睡眠嗜組織菌(*Histophilus somni*)引起牛的呼吸道疾病。

用法用量 | 本品用於牛隻肌肉注射或皮下注射；豬隻肌肉注射

豬 | 肌肉注射：每48小時分兩次使用，每公斤體重注射15mg之富洛欣(相當於每20公斤體重使用本品1毫升)於豬頸肌肉。使用16號針頭，同一部位不可注射超過3毫升。

牛 | 肌肉注射：每48小時分兩次使用，每公斤體重注射20mg之富洛欣 (相當於每15公斤體重使用本品1毫升)。

皮下注射：每公斤體重注射40mg之富洛欣(相當於每15公斤體重使用本品2毫升)，使用16號針頭，同一部位不可注射超過10毫升，僅可注射於頸部。

禁忌症 |



- 請勿使用於種公豬與種公牛上
- 產奶供食用的乳牛不可使用
- 請勿使用於對本品主成分和賦形劑具有高度敏感性之動物
- 請勿使用於體重低於2公斤的仔豬上

停藥期 |



- 豬** | 肉豬 / 14天
- 牛** | 肉牛 / **肌肉注射**：30天。**皮下注射**：44天
乳牛 / 泌乳期間乳牛禁用

包裝 | 100mlx30瓶 / 小箱x2 / 大箱

注意事項 | 請置於陰涼場所存放，避免陽光直射

台灣總代理——

JRI 佳力德實業有限公司
Jaritec Industrial Co.,Ltd.

地址 | 台北市大安區信義路四段341號6樓之2

電話 | 02-2700-3163 傳真 | 02-2325-7047

製造商——

 **Laboratorios syva, Spain**
西班牙喜驊大藥廠



動物藥入字第07189號

製造
歐盟

原裝進口

動物用注射劑