

動物藥入字第 07312 號

動物用 散劑



多喜康 DOXICOR

歐盟地區藥廠製造 | 原裝進口 | 藥效確實

動物用 泡 水 用 散 劑

生產規格最嚴謹的
歐盟地區藥廠製造

研發過程中，針對——

原料、配方、成品

——進行動物效果試驗

確認 **多喜康** 治療藥效
DOXICOR

· [豬]、[雞]專用藥物

成分 |

Doxycycline

500mg (相當於554.6 mg的Doxycycline hyclate)

Excipients

加至 1 g

動物用 散劑

[豬]、[雞]專用藥物

效能 |

多喜康
DOXICOR



豬 | 治療由 *Mycoplasma hyopneumoniae* (肺炎黴漿菌) 引起的呼吸道疾病。



肉雞 | 治療由 *Mycoplasma gallisepticum* (敗血性黴漿菌) 引起的呼吸道疾病。
※不含產蛋中之蛋雞※

用法用量 | 口服。

將粉末溶解於飲水中服用，或將添加藥物的飲水加入液體飼料中服用，必須立即食用完畢。

種別	標準劑量	現場使用參考劑量 (基本建議用量)
	每100公斤體重使用2克的多喜康 (相當於每公斤體重使用10毫克的Doxycycline)。	• Doxycycline 200 ppm相當於每噸飼料添加————— 多喜康 DOXICOR 0.4公斤
	每100公斤體重使用2克的多喜康 (相當於每公斤體重使用10毫克Doxycycline)，或每公升飲水中添加多喜康0.1~0.2公克。	※不含產蛋中之蛋雞※ • Doxycycline 50~100 ppm相當於每噸飲水添加————— 多喜康 DOXICOR 0.1~0.2公斤

肉雞飲水添加公式 | $\frac{\text{每日每公斤體重給予本品 (mg)} \times \text{治療對象動物群的平均體重 (kg)}}{\text{單隻對象動物每日平均飲水量 (L)}} = \text{每公升飲水所需本品的量 (mg)}$

停藥期 |

- 肉雞：肉和內臟→7天
- 豬：肉和內臟→8天

使用類別 |

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。

包裝 |

- 1公斤瓶裝
- 5公斤袋裝

製造商



偉牠魁諾大藥廠

進口商



佳力德實業有限公司 Jaritec Industrial Co., Ltd.

地址 | 台北市大安區信義路四段341號6樓之2 電話 | 02-2700-3163 傳真 | 02-2325-7047



2021-07-1000